

Baccalauréat ES Nouvelle-Calédonie
novembre 2007

EXERCICE 1

4 points

Commun à tous les candidats

Soit f une fonction définie et dérivable sur l'intervalle $]0; +\infty[$, strictement croissante sur l'intervalle $]0; 2]$ et strictement décroissante sur l'intervalle $[2; +\infty[$.

On note f' la fonction dérivée de f sur l'intervalle $]0; +\infty[$.


La courbe Γ représentative de la fonction f dans un repère orthonormé est tracée ci-dessous.

Elle passe par les points $A\left(\frac{1}{2}; -2\right)$, $B(1; 0)$, $C(2; 1)$ et $D\left(\frac{7}{2}; 0\right)$.

E est le point de coordonnées $\left(1; \frac{3}{2}\right)$.

La courbe Γ admet au point C une tangente parallèle à l'axe des abscisses.

La droite (AE) est tangente à la courbe Γ au point A.



Pour chacune des affirmations ci-dessous, cocher la case V (l'affirmation est vraie) ou la case F (l'affirmation est fausse) sur l'annexe, à rendre avec la copie.

Les réponses ne seront pas justifiées.

NOTATION : une réponse exacte rapporte 0,5 point ; une réponse inexacte retire 0,25 point ; l'absence de réponse ne rapporte aucun point et n'en enlève aucun. Si le total des points est négatif, la note globale attribuée à l'exercice est 0.

1. L'équation $f(x) = -1$ admet exactement deux solutions sur l'intervalle $]0; +\infty[$
2. Le coefficient directeur de la droite (AE) est égal à $\frac{1}{7}$.
3. Les fonctions f et f' ont le même signe sur l'intervalle $[1; 2]$.
4. Les primitives de la fonction f sont croissantes sur l'intervalle $\left[1; \frac{7}{2}\right]$.
5. On peut calculer $\ln[f(x)]$ pour tout réel x de l'intervalle $]0; +\infty[$.
6. La fonction g définie sur l'intervalle $[2; +\infty[$ par $g(x) = e^{f(x)}$ est croissante sur cet intervalle.

EXERCICE 2

5 points

Candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité

Un club sportif a été créé au début de l'année 2000 et, au cours de cette année-là, 140 adhérents s'y sont inscrits.

Le tableau ci-dessous donne le nombre d'adhérents de 2000 à 2005.

année	2000	2001	2002	2003	2004	2005
rang de l'année x_i	0	1	2	3	4	5
nombre d'adhérents y_i	140	165	220	240	260	310

Le détail des calculs statistiques à effectuer à la calculatrice n'est pas demandé.


1. Représenter dans un repère orthogonal (O, \vec{i}, \vec{j}) le nuage des points $M_i(x_i; y_i)$ associé à cette série statistique.
On prendra comme unités graphiques 2 cm pour 1 année en abscisse et 1 cm pour 10 adhérents en ordonnées. Sur l'axe des ordonnées, on commencera la graduation à 120.
2. Un premier ajustement du nuage des points $M_i(x_i; y_i)$
 - a. On désigne par G_1 , le point moyen des trois points M_1, M_2 et M_3 du nuage et par G_2 le point moyen des trois points M_4, M_5 et M_6 du nuage. Calculer les coordonnées respectives de G_1 et de G_2 dans le repère (O, \vec{i}, \vec{j}) .
 - b. Déterminer l'équation réduite $y = Ax + B$ de la droite (G_1G_2) dans le repère (O, \vec{i}, \vec{j}) .
Les coefficients A et B seront donnés sous la forme de fractions irréductibles.
Tracer la droite (G_1G_2) sur le graphique.
 - c. En utilisant la droite (G_1G_2) comme droite d'ajustement du nuage, calculer le nombre d'adhérents au club sportif que l'on peut prévoir pour l'année 2007.
3. Dans cette question, on utilise la droite des moindres carrés,
 - a. Soit Δ la droite d'ajustement de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés. Donner, à l'aide de la calculatrice, une équation de la droite Δ dans le repère (O, \vec{i}, \vec{j}) .
 - b. En utilisant la droite Δ , calculer le nombre d'adhérents au club sportif que l'on peut prévoir pour l'année 2007.
4.
 - a. Si le taux d'augmentation du nombre d'adhérents d'une année à l'autre était fixe et égal à $t\%$, quelle serait la valeur de t arrondie au centième qui donnerait la même augmentation du nombre d'adhérents entre 2000 et 2005?
 - b. Avec ce même taux d'augmentation t , quel serait le nombre d'adhérents, arrondi à l'unité, pour l'année 2007?

EXERCICE 2

5 points

Candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité

Sur le graphe ci-contre, les sept sommets A, B, C, D, E, F et G correspondent à sept villes. Une arête reliant deux de ces sommets indique l'existence d'une liaison entre les deux villes correspondantes.



Les questions 1, 2 et 3 sont indépendantes.

1. Est-il possible de trouver un trajet, utilisant les liaisons existantes, qui part d'une des sept villes et y revient en passant une fois et une seule fois par toutes les autres villes?

2. On note M la matrice associée au graphe ci-dessus. Les sommets sont rangés suivant l'ordre alphabétique.

$$\text{On donne } M^3 = \begin{pmatrix} 0 & 7 & 6 & 1 & 0 & 4 & 2 \\ 7 & 2 & 1 & 10 & 9 & 1 & 5 \\ 6 & 1 & 0 & 9 & 8 & 0 & 3 \\ 1 & 10 & 9 & 2 & 1 & 7 & 5 \\ 0 & 9 & 8 & 1 & 0 & 6 & 3 \\ 4 & 1 & 0 & 7 & 6 & 0 & 2 \\ 2 & 5 & 3 & 5 & 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Donner le nombre de chemins de longueur 3 qui relient le sommet A au sommet F.

Les citer tous. Aucune justification n'est demandée.

3. On donne ci-dessous et sur le graphe ci-contre les distances exprimées en centaines de kilomètres entre deux villes pour lesquelles il existe une liaison :

AB : 5 ; AC : 7 ;


BD : 8 ; BE : 15 ;

BG : 6 ; CD : 10 ;

CE : 15 ; DF : 20 ;

DG : 10 ; EF : 5 ;

Un représentant de commerce souhaite aller de la ville A à la ville F.



En expliquant la méthode utilisée, déterminer le trajet qu'il doit suivre pour que la distance parcourue soit la plus courte possible et donner cette distance.

EXERCICE 3

5 points

Commun à tous les candidats

Une étude réalisée auprès des élèves d'un lycée a permis d'établir que 55 % des élèves possèdent un ordinateur. Parmi les élèves qui ont un ordinateur, 98 % possèdent un téléphone portable.

De plus, parmi ceux qui possèdent un téléphone portable, 60 % possèdent un ordinateur.

Dans tout l'exercice, on arrondira les résultats au centième donc les pourcentages à l'unité.

Les parties A et B sont indépendantes.

Partie A : on choisit au hasard un élève de ce lycée.

On note :

- M l'évènement : « L'élève possède un ordinateur » ;
- T l'évènement : « L'élève possède un téléphone portable » ;
- \overline{M} l'évènement contraire de M ;
- \overline{T} l'évènement contraire de T .

1.
 - a. Calculer la probabilité que l'élève possède un ordinateur et un téléphone portable.
 - b. En déduire la probabilité que l'élève possède un téléphone portable.
2.
 - a. On prend 0,90 comme valeur de la probabilité de l'évènement T . Calculer la probabilité que l'élève ne possède pas d'ordinateur mais possède un téléphone portable.
 - b. En déduire la probabilité que l'élève possède un téléphone portable sachant qu'il ne possède pas d'ordinateur.

Partie B : on choisit trois élèves au hasard, indépendamment les uns des autres.
On note E l'évènement : « Exactement deux des trois lycéens choisis possèdent un ordinateur ».
Calculer la probabilité de l'évènement E.

EXERCICE 4**7 points****Commun à tous les candidats****Partie A**On considère la fonction h définie et dérivable sur \mathbb{R} par

$$h(x) = e^{2x} - 7e^x + 6.$$

On note h' sa fonction dérivée.

1. **a.** Calculer la limite de la fonction h en $-\infty$.
b. Calculer la limite de la fonction h en $+\infty$; on pourra utiliser l'égalité vraie pour tout réel x : $h(x) = e^x(e^x - 7 + 6e^{-x})$.
2. Calculer $h\left[\ln\left(\frac{7}{2}\right)\right]$, $h(0)$ puis $h(\ln 6)$.
3. Déterminer par le calcul l'image $h'(x)$ d'un réel x par la fonction h' et étudier les variations de la fonction h .
Dresser le tableau de variations de la fonction h et faire figurer les résultats des questions précédentes dans ce tableau.
4. En déduire le tableau des signes de la fonction h .

Partie BOn considère les fonctions f et g définies sur \mathbb{R} par

$$f(x) = 6 - 6e^{-x} \quad \text{et} \quad g(x) = e^x - 1.$$

On note \mathcal{C}_f et \mathcal{C}_g les courbes représentatives des fonctions f et g dans un repère du plan d'unités graphiques : 2 cm en abscisses et 1 cm en ordonnées.Les courbes \mathcal{C}_f et \mathcal{C}_g sont données en annexe.

1. Démontrer que le point de coordonnées $(\ln 6 ; 5)$ est un point d'intersection des courbes \mathcal{C}_f et \mathcal{C}_g .
2. **a.** Démontrer que, pour tout réel x , $f(x) - g(x) = \frac{-h(x)}{e^x}$.
b. Déterminer, par le calcul, la position relative des courbes \mathcal{C}_f et \mathcal{C}_g .
3. On note \mathcal{D} le domaine du plan limité par les courbes \mathcal{C}_f , \mathcal{C}_g et les droites d'équations respectives $x = 0$ et $x = \ln 6$.
a. Hachurer le domaine \mathcal{D} sur le graphique donné en annexe.
b. Calculer la valeur exacte de l'aire du domaine \mathcal{D} en cm^2 puis en donner une valeur approchée arrondie au centième.

ANNEXE

À compléter et à rendre avec la copie

Exercice 1

Affirmation	V	F
1. L'équation $f(x) = -1$ admet exactement deux solutions sur l'intervalle $]0; +\infty[$.		
2. Le coefficient directeur de la droite (AE) est égal à $\frac{1}{7}$.		
3. Les fonctions f et f' ont le même signe sur l'intervalle $[1; 2]$.		
4. Les primitives de la fonction f sont croissantes sur l'intervalle $\left[1; \frac{7}{2}\right]$.		
5. On peut calculer $\ln[f(x)]$ pour tout réel x de l'intervalle $]0; +\infty[$.		
6. La fonction g définie sur l'intervalle $[2; +\infty[$ par $g(x) = e^{f(x)}$ est croissante sur cet intervalle.		

Exercice 4

